



PROVA AMRIGS 2020

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: CIRURGIA GERAL

CARGO(S): ACESSO DIRETO

QUESTÃO: 11 – MANTIDA alternativa 'D'. A Sarcoidose, mencionada como uma alternativa possível se opõe ao título da questão (derrame pleural comum na prática médica) e pode ser imediatamente excluída pela raridade de sua associação com derrame pleural. (SABISTON, Textbook of Surgery). Recurso indeferido.

MATÉRIA: OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

CARGO(S): ACESSO DIRETO

QUESTÃO: 22 – MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I não exclui qualquer outra modalidade de avaliação para diagnóstico, como, por exemplo, a realização de exame físico. Este (exame físico), seguindo os critérios propedêuticos de avaliação de qualquer gestante, certamente já foi realizado quando da indicação do partograma. (Rotinas em Obstetrícia). Recurso indeferido.

MATÉRIA: PEDIATRIA

CARGO(S): ACESSO DIRETO

QUESTÃO: 27 – MANTIDA alternativa 'C'. Para avaliação da anemia associada à deficiência de ferro, a análise qualitativa e quantitativa dos glóbulos vermelhos, e a microcitose (avaliada pelo volume corpuscular médio – VCM) e a hipocromia (avaliada pela hemoglobina corpuscular média – HCM) ESTÃO SEMPRE PRESENTES. Já a amplitude de variação do tamanho dos eritrócitos (red-cell distributionwidth – RDW) consiste em índice de variação do tamanho dos glóbulos vermelhos e pode ser utilizada para identificar anisocitose. Os valores de RDW, fornecidos por equipamentos automatizados, oscilam entre 11,5 e 14,5%. Valores superiores a 14,5% PODEM ser encontrados em indivíduos com deficiência de ferro... (Tratado de Pediatria). Recurso indeferido.